

MoviGo®

DISPOSITIF MÉDICAL CE0426

Pour les selles dures, le transit irrégulier et la constipation

1. Quel est ce produit et dans quel cas est-il utilisé ?

Ce produit est un dispositif médical qui contribue à restaurer un transit régulier et naturel chez les adultes, les adolescents, les enfants de plus de 2 ans et les personnes âgées.



Il utilise la puissance de l'eau, avec sa formule en 3 étapes, pour attirer l'eau jusque dans les selles afin de les hydrater, les ramollir et restaurer un transit confortable, naturel et régulier.

Il peut être utilisé pour soulager les selles dures et la constipation. Ce produit ramollit les selles pour rendre votre transit plus confortable. Il ne provoque donc pas de crampes ni de douleurs abdominales.

Il n'est pratiquement pas absorbé par l'organisme et est évacué avec les selles lors du transit. Il n'y a pas de perte d'effet au cours du temps.

1.1 Composants

Chaque sachet de ce produit contient 10 g de poudre Macrogol 3350.

2. Conditionnement

Ce produit se présente sous forme de poudre contenue dans un sachet, préparée en solution buvable.

Ce produit est disponible en boîtes de 10 ou 20 sachets. Toutes les tailles de boîtes peuvent ne pas être commercialisées.

3. Posologie

Enfants de 2 à 11 ans (de 12 kg à 20 kg) : 1 à 2 sachets (10 g chacun) par jour, selon la gravité des selles dures ou de la constipation.

Adultes et enfants de plus de 11 ans (ou plus de 20 kg) : 1 sachet (10 g chacun) 1 à 3 fois par jour, selon la gravité de vos selles dures ou de votre constipation.

Si vous oubliez de prendre une dose, ne prenez pas de double dose. Attendez et prenez la dose suivante à l'heure habituelle.

La durée du traitement est habituellement de 2 semaines. En cas de besoin, le traitement peut être répété.

4. Contre-indications

N'ingérez pas ce produit si vous êtes atteint(e) de :

- Sténose intestinale
- Perforation intestinale
- Maladie inflammatoire de l'intestin (par exemple maladie de Crohn, rectocolite hémorragique)
- N'ingérez pas ce produit si vous souffrez d'une obstruction intestinale (occlusion intestinale, iléus)

Pour les patients atteints d'insuffisance rénale, il n'est pas nécessaire d'ajuster la posologie. La constipation peut être causée par certains médicaments, y compris les analgésiques (opioïdes) et les traitements contre la maladie de Parkinson (anticholinergiques). Elle peut également résulter d'autres maladies, notamment la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson.

5. Grossesse et allaitement

Aucune donnée n'est disponible concernant l'utilisation de ce produit pendant la grossesse ou l'allaitement. Si vous êtes enceinte, si vous essayez de devenir enceinte ou si vous allaitez, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin avant de prendre ce produit.

6. Effets secondaires

Il est recommandé de ne pas dépasser la posologie suggérée, des doses plus élevées pouvant entraîner des effets secondaires imprévus.

Ce produit peut provoquer des effets secondaires légers, tels que : troubles gastro-intestinaux, borborygmes (gargouillements intestinaux), douleurs abdominales, nausées et diarrhée légère (en particulier en début de traitement). De rares réactions d'hypersensibilité (éruption cutanée, urticaire) peuvent survenir. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous rencontrez des effets indésirables, même si vos symptômes ne sont pas répertoriés ici. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

7. Surdosage

En cas de surdosage, les effets suivants peuvent se produire : douleur intense, distension abdominale, diarrhée et vomissements pouvant provoquer un déséquilibre électrolytique. Si des réactions indésirables se produisent, contactez immédiatement votre médecin.

8. Interactions avec des médicaments

À ce jour, il n'existe aucune interaction connue avec des médicaments. Cependant, si vous devez prendre un médicament simultanément à ce produit, vous devez prendre votre prochaine dose de ce produit au moins 2 heures après l'administration de médicaments par voie orale ou de tout autre médicament (médicaments homéopathiques compris) ou de compléments alimentaires en raison de l'action osmotique du macrogol et de l'accélération du transit gastro-intestinal, qui peuvent en altérer l'efficacité. Consultez votre médecin avant de prendre ce produit si vous utilisez actuellement d'autres traitements.

9. Conservation

Conserver ce produit dans un endroit sec et à l'abri de sources directes de chaleur ou de lumière : ouvrir le sachet au moment de l'utilisation. Ne pas utiliser si le sachet est endommagé. Tenir hors de portée des enfants. Conserver le dispositif à une température inférieure à 25 °C.

10. Avertissements et précautions

Ne pas utiliser le produit chez les enfants de moins de 2 ans. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, vous ne devez consommer ce produit qu'après avoir consulté un médecin. Il est recommandé de ne pas dépasser les quantités suggérées, car des doses plus élevées peuvent provoquer des effets secondaires imprévus.

Une utilisation prolongée peut s'imposer en cas de constipation réfractaire et/ou chronique. Ne pas utiliser pendant plus de 30 jours consécutifs. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

Ne pas prendre ce produit en cas d'intolérance à celui-ci. Ne pas ingérer ce produit en cas d'hypersensibilité connue aux composants et au polyéthylène glycol. Chaque sachet est jetable et ne doit être ouvert qu'au moment de l'utilisation.

11. Date de péremption

Ne pas prendre après la date de péremption imprimée sur l'emballage.

La date de péremption s'applique au produit conservé dans son contenant intact.

12. Élimination

Le dispositif périmé doit être éliminé conformément aux réglementations de gestion des déchets en vigueur.

Veuillez ne pas jeter ce produit sur la voie publique. Éliminez le conditionnement de ce produit de manière responsable.

MoviGo, Norgine et le logo avec la voile sont des marques déposées du groupe de sociétés Norgine.



SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALIE



Norgine SAS
23 rue François Jacob
92500 Rueil-Malmaison
France



Votre avis est important ! Afin d'évaluer votre satisfaction concernant ce produit, prenez 5 minutes pour remplir le court questionnaire que vous trouverez à l'adresse : <https://siit-pms.com/GC04B2>

ou en scannant ce code QR :



Dernière révision : 01/2025

MoviGo®

MEDISCH HULPMIDDEL CE0426

Voor hardnekkige ontlasting, onregelmatige stoelgang en obstipatie

1. Wat is het product en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit product is een medisch hulpmiddel dat een natuurlijke regelmatige stoelgang helpt te herstellen bij volwassenen, adolescenten, kinderen ouder dan 2 jaar en ouderen.

Het gebruikt de kracht van water, met zijn 3-stapsformule, door water in de ontlasting te brengen om deze te hydrateren, zacht te maken en om een comfortabele, natuurlijke, regelmatige stoelgang te herstellen.

Het kan gebruikt worden om hardnekkige ontlasting en obstipatie te verlichten. Omdat dit product de ontlasting zachter maakt om uw stoelgang comfortabel te maken, veroorzaakt het geen krampen of buikpijn.

Dit product wordt vrijwel niet door het lichaam opgenomen en wordt tijdens de stoelgang met de ontlasting afgevoerd. De werking ervan neemt in de loop van de tijd niet af.

1.1 Bestanddelen

Elk zakje van dit product bevat 10 g Macrogol 3350-poeder.

2. Verpakking

Dit product is een poeder in een zakje waar een drank van wordt gemaakt.

Dit product bestaat in verpakkingen van 10 en 20 zakjes. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

3. Dosering

Kinderen van 2 tot 11 jaar (van 12 kg tot 20 kg): 1-2 zakjes (elk 10 g) per dag, afhankelijk van de ernst van uw hardnekkige ontlasting of obstipatie.

Volwassenen & kinderen ouder dan 11 jaar (of meer dan 20 kg): 1 zakje (elk 10 g) 1-3 keer per dag, afhankelijk van de ernst van uw hardnekkige ontlasting of obstipatie.

Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem dan geen dubbele dosis. Wacht in plaats daarvan en neem de volgende dosis op uw normale tijdstip.

De duur van de behandeling is meestal 2 weken. Indien nodig kan de behandeling herhaald worden.

4. Contra-indicaties

Neem dit product niet in als u last hebt van:

- Darmstenose
- Darmperforatie
- Inflammatoire darmziekte (als voorbeeld ziekte van Crohn, colitis ulcerosa)
- Neem niet in als u een blokkade in uw darmen heeft (darmobstructie, ileus)

Voor patiënten met een nierfunctiestoornis is het niet nodig de dosering aan te passen. Obstipatie kan veroorzaakt worden door bepaalde geneesmiddelen, waaronder pijnstillers (opioïden) en Parkinson-behandelingen (anticholinergica). Het kan ook optreden als een resultaat van andere ziekten, waaronder multiple sclerose of de ziekte van Parkinson.

5. Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van dit product tijdens de zwangerschap of tijdens de borstvoeding. Als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u dit product inneemt.

6. Bijwerkingen

Het wordt aanbevolen om de voorgestelde dosering niet te verhogen, omdat dit kan leiden tot onverwachte bijwerkingen.

Dit product kan milde bijwerkingen veroorzaken, zoals gastro-intestinale aandoeningen, borborygmi (darmgerommel), buikpijn, misselijkheid en lichte diarree (vooral bij het begin van de behandeling). Zeldzame overgevoelighedsreacties (uitslag, urticaria) kunnen optreden. Raadpleeg uw arts of apotheker als u bijwerkingen ervaart, zelfs als uw symptomen hier niet worden vermeld. Als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan uw arts.

7. Overdosering

In geval van overdosering kunnen de volgende bijwerkingen optreden: intense pijn, opgezette buik, diarree en braken die een verstoring van de elektrolytenbalans kunnen veroorzaken. Als er bijwerkingen optreden, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

8. Interacties met geneesmiddelen

Tot op heden zijn er geen interacties met geneesmiddelen bekend. Als u echter een geneesmiddel moet innemen terwijl u dit product ook gebruikt, neemt u uw volgende dosis van dit product in ten minste 2 uur na toediening van oraal ingenomen geneesmiddelen of andere geneesmiddelen (homeopathische geneesmiddelen inbegrepen) of voedingssupplementen. De osmotische kracht van macrogol en de toename van de gastro-intestinale transitsnelheid kunnen namelijk de werkzaamheid van eerder ingenomen geneesmiddelen of supplementen negatief beïnvloeden. Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt als u momenteel onder andere behandelingen bent.

9. Bewaren

Bewaar dit product op een droge plaats en uit de buurt van directe warmte of lichtbronnen: open het zakje op het moment van gebruik. Niet gebruiken als de zakjes beschadigd zijn. Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaar het hulpmiddel onder 25 °C.

10. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Gebruik het product niet bij kinderen jonger dan 2 jaar. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u dit product alleen gebruiken na overleg met een arts. Aanbevolen wordt om de voorgestelde hoeveelheden niet te overschrijden, omdat hogere doses onverwachte bijwerkingen kunnen veroorzaken.

Langdurig gebruik kan nodig zijn in het geval van refractaire en/of chronische constipatie. Niet langer dan 30 opeenvolgende dagen gebruiken. Als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan een arts.

Niet gebruiken in geval van intolerantie voor het product. Niet gebruiken in geval van bekende overgevoeligheid voor de bestanddelen en voor polyethyleenglycol. Elk zakje is wegwerpbaar en mag alleen worden geopend op het moment van gebruik.

11. Vervaldatum

Gebruik niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking.

De uiterste houdbaarheidsdatum heeft betrekking op het product wanneer het in de intacte verpakking wordt bewaard.

12. Verwijdering

Verlopen hulpmiddelen moeten worden verwerkt volgens de afvalverwerkingsrichtlijnen van de lokale overheid.

Gelieve geen afval achter te laten. Gooi het verpakkingsafval van dit product op een verantwoorde manier weg.

MoviGo, Norgine en het zeil logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Norgine bedrijvengroep.



SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALIË



Norgine Pharma B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam, Nederland



Uw mening is belangrijk! Neem 5 minuten de tijd om uw tevredenheid over het product te beoordelen d.m.v. de korte vragenlijst die u vindt onder de volgende link <https://siit-pms.com/GC04B2>.

Of door deze QR-code te scannen:



Laatste revisie: 01/2025

MoviGo®

MEDIZINPRODUKT CE0426

Bei trägem Stuhl, schwerer und seltener Darmentleerung & Verstopfung

1. Was ist dieses Produkt und wofür wird es angewendet?

Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt, das dabei hilft, bei Erwachsenen, Kindern über 2 Jahren und älteren Menschen die natürliche Darmbewegung wieder anzuregen.

Mit seinem dreistufigen Wirkprinzip nutzt es den Effekt von Wasser, um den trägen Stuhl zu hydratisieren, ihn aufzuweichen und so die natürliche Darmbewegung wieder anzuregen.

Es kann bei trägem Stuhl und Verstopfung angewendet werden. Dieses Produkt weicht den Stuhl auf, sorgt so für einen angenehmen Stuhlgang und verursacht keine Krämpfe oder Bauchschmerzen.

Dieses Produkt wird vom Körper praktisch nicht aufgenommen und es wird mit dem Stuhlgang ausgeschieden. Seine Wirksamkeit lässt mit der Zeit nicht nach.

1.1 Bestandteile

Jeder Beutel dieses Produkts enthält 10 g Macrogol 3350 Pulver.

2. Packung

Dieses Produkt ist ein Pulver in einem Beutel zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen.

Dieses Produkt ist in Packungen mit 10 oder 20 Beuteln erhältlich. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

3. Dosierung

Kinder 2 bis 11 Jahre (zwischen 12 kg und 20 kg):
1 – 2 Beutel (à 10 g) täglich, entsprechend der Schwere des trägen Stuhls oder der Verstopfung.

Erwachsene und Kinder über 11 Jahre (oder über 20 kg):
1 Beutel (à 10 g) 1 – 3-mal täglich, entsprechend der Schwere des trägen Stuhls oder der Verstopfung.

Wenn Sie eine Dosis vergessen haben, nehmen Sie keine doppelte Dosis ein. Warten Sie stattdessen und nehmen Sie die nächste Dosis zur gewohnten Zeit ein.

Die Behandlungsdauer mit diesem Produkt sollte zwei Wochen nicht überschreiten. Bei Bedarf kann die Behandlung wiederholt werden.

4. Kontraindikationen

Nehmen Sie dieses Produkt in folgenden Fällen nicht ein:

- Darmverengung
- Darmdurchbruch (Perforation)
- Entzündliche Darmerkrankung (z. B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)
- Nicht einnehmen, wenn Sie einen Darmverschluss (Ileus) haben

Für Patienten mit Niereninsuffizienz ist keine Dosisanpassung erforderlich. Eine Verstopfung kann durch bestimmte Medikamente verursacht werden, darunter Schmerzmittel (Opiode) und Parkinson-Medikamente (Anticholinergika). Sie kann aber auch als Folge anderer Erkrankungen auftreten, z. B. Multiple Sklerose oder Morbus Parkinson.

5. Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine Daten über die Anwendung von diesem Produkt während der Schwangerschaft oder Stillzeit vor. Wenn Sie schwanger sind, schwanger werden möchten oder stillen, fragen Sie vor der Einnahme von diesem Produkt Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

6. Nebenwirkungen

Es wird empfohlen, die angegebenen Einnahmemengen nicht zu überschreiten, da höhere Dosen das Auftreten unerwarteter Nebenwirkungen verursachen können.

Dieses Produkt kann milde Nebenwirkungen verursachen, wie zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden, Borborygmi (Darmgeräusche), Bauchschmerzen, Übelkeit und leichter Durchfall (besonders zu Beginn der Behandlung). Selten können Überempfindlichkeitsreaktionen (Rötung der Haut, Nesselsucht) auftreten. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, auch wenn Ihre Symptome hier nicht aufgeführt sind. Kontaktieren Sie Ihren Arzt, wenn die Symptome anhalten.

7. Überdosierung

Im Fall einer Überdosierung können folgende Effekte auftreten: starke Schmerzen, Blähungen, Durchfall und Erbrechen, die ein Elektrolyt-Ungleichgewicht verursachen können. Wenn unerwünschte Wirkungen auftreten, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.

8. Wechselwirkungen mit anderen Produkten

Bislang sind keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt. Es besteht die Möglichkeit, dass durch die osmotische Wirkung und die Erhöhung der gastrointestinalen Transitgeschwindigkeit durch Macrogol die Wirkung gleichzeitig oral eingenommener Arzneimittel, anderer Medikamente (auch homöopathischer Arzneimittel) oder Nahrungsergänzungsmittel, beeinträchtigt wird. Daher sollten Sie dieses Produkt mindestens 2 Stunden nach der Einnahme anderer oral eingenommener Produkte einnehmen. Bitte konsultieren Sie vor der Einnahme von diesem Produkt Ihren Arzt, wenn Sie derzeit andere Produkte einnehmen.

9. Aufbewahrung

Dieses Produkt sollte an einem trockenen und vor direkter Wärme- oder Lichteinwirkung geschützten Ort bei einer Temperatur unter 25° C aufbewahrt werden. Beutel nur zum Zeitpunkt der Einnahme öffnen. Beschädigte Beutel nicht mehr verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

10. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Die Anwendung von diesem Produkt ist bei Kindern unter 2 Jahren nicht empfohlen. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, sollten Sie dieses Produkt nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden. Es wird empfohlen, die angegebenen Einnahmemengen nicht zu überschreiten, da höhere Dosen das Auftreten unerwarteter Nebenwirkungen verursachen können.

Im Falle einer refraktären und/oder chronischen Verstopfung kann eine längere Anwendung erforderlich sein. Nicht länger als 30 Tage ununterbrochen einnehmen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt konsultieren.

Bei Unverträglichkeit gegenüber diesem Produkt oder einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber den Bestandteilen und Polyethylenglycol sollte dieses Produkt nicht eingenommen werden. Jeder Beutel ist ein Einwegartikel und sollte nur zum Zeitpunkt der Einnahme geöffnet werden.

11. Verfallsdatum

Nach Ablauf des auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Das Verfallsdatum bezieht sich auf das Produkt bei Lagerung in seinem unversehrten Behältnis.

12. Entsorgung

Abgelaufene Produkte müssen entsprechend der nationalen Anforderungen entsorgt werden.

Bitte nicht einfach wegwerfen. Entsorgen Sie den Verpackungsmüll dieses Produkts verantwortungsbewusst.

MoviGo, Norgine und das Norgine-Segel sind eingetragene Marken der Norgine-Unternehmensgruppe.



SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALIEN



Norgine N.V./S.A.
Philipssite 5 bus 1
3001 Heverlee
België/Belgique/Belgien



Ihre Meinung ist uns wichtig. Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, und bewerten Sie, wie zufrieden Sie mit dem Produkt sind. Füllen Sie dafür die kurze Umfrage unter dem folgenden Link aus: <https://siit-pms.com/GC04B2>

oder scannen Sie diesen QR-Code:



Stand: 01/2025